

LASCA

Ciprinidi



LASCA (*Chondrostoma genei* Bonaparte)
Famiglia: Cyprinidae

Morfologia:

la Lasca ha corpo slanciato con dorso bruno, fianchi argentei percorsi da una fascia scura, ventre bianco-argenteo; la base delle pinne ventrali e pettorali è colorata di arancione. Assai caratteristica è la forma della bocca, simile soltanto alla Savetta, per la posizione rivolta verso il basso e per la presenza di labbra cornee.

Riproduzione e accrescimento:

la riproduzione ha luogo in un periodo compreso fra marzo e maggio, su fondali ciottolosi o ghiaiosi. Le uova hanno un diametro di 1,5 mm circa ed aderiscono al fondo; la schiusa avviene all'incirca 10 giorni dopo la deposizione. Gli individui adulti non superano i 25 cm di lunghezza.

Alimentazione:

la sua dieta è di tipo onnivoro ed è composta dagli organismi vegetali ed animali che ricoprono il fondo.

Habitat:

è una specie che frequenta soprattutto le acque correnti in branchi più o meno numerosi; si rinviene comunque anche in acque poco turbolente ed anche nei laghi.

Comportamento:

è specie gregaria che vive di solito abbastanza in profondità. Si alimenta raschiando il fondo grazie alla forma particolare della bocca.

Distribuzione:

in Italia è indigena delle regioni settentrionali e di quelle centrali del versante adriatico.