

## LATTERINO

### *Atherinidi*



### **LATTERINO (*Atherina boyeri* Risso)**

#### **Famiglia: Atherinidae**

#### **Morfologia:**

il Latterino ha il profilo dorsale quasi dritto; la bocca è obliqua e si apre superiormente. Ha due pinne dorsali nettamente distanziate; la pinna caudale è forcuta. Il dorso è generalmente verdastro con riflessi metallici. Sui fianchi decorre una fascia argentea affiancata al di sotto da una sottile linea bruna; il ventre è argenteo.

#### **Riproduzione e accrescimento:**

si riproduce da aprile a settembre e le uova vengono deposte un pò alla volta ad intervalli di alcuni giorni. Queste sono provviste di appendici filiformi con le quali aderiscono alla vegetazione ed alle pietre del fondo, schiudendo dopo 12-13 giorni. Le larve misurano alla schiusa 6 mm circa. Gli adulti possono raggiungere le dimensioni massime di 13-14 cm, ma la taglia più comune è di 8-10 cm. L'età massima è di 2-3 anni, ma sembra possa vivere fino a 5 anni.

#### **Alimentazione:**

è specie prevalentemente zooplanctofaga (cladoceri e copepodi) ma nei laghi e nei fiumi gli adulti possono essere anche bentonici, predando larve di insetti, vermi e piccoli molluschi.

#### **Habitat:**

eurialino, vive sia in mare che in acque salmastre e dolci dove prevalentemente si riproduce. E' specie non rustica e sensibile alla diminuzione della concentrazione di ossigeno e alla presenza di sostanze tossiche.

#### **Comportamento:**

è specie gregaria e molto predata.

#### **Distribuzione:**

diffuso in Italia lungo le coste, nelle lagune e nell'ultimo tratto dei fiumi.