

## TEMOLO

### *Timallidi*



### **TEMOLO (*Thymallus thymallus* Linnaeus)**

#### **Famiglia: Salmonidae**

#### **Morfologia:**

il Temolo ha corpo compresso ed allungato; il capo è abbastanza piccolo in proporzione al corpo e la bocca è stretta. E' facilmente riconoscibile, inoltre, per le due pinne dorsali: la prima di forma trapezoidale, alta e lunga e macchiettata di nero; la seconda piccola e adiposa come quella delle trote. Il dorso è color olivastro, mentre i fianchi sono argentei con linee scure longitudinali. Presenta alcune macchie nere nella parte anteriore del corpo; il ventre è bianco.

#### **Riproduzione e accrescimento:**

si riproduce da marzo ad aprile ed in tale epoca la pinna dorsale dei maschio diventa iridescente. Le uova gialle (2-3,5 mm di diametro) vengono deposte sul fondo e poi ricoperte. Ogni femmina è in grado di liberarne da 6.000 a 7.000 per Kg di peso. In genere sono necessarie da 3 a 4 settimane di tempo per ottenerne la schiusa, a seconda della temperatura dell'acqua. L'accrescimento può essere assai variabile: al primo anno di vita i giovani temoli possono misurare da 7 a 12 cm di lunghezza, ai secondo anno raggiungono i 20-25 cm ed al terzo i 25-30 cm. Raramente supera i 40 cm di lunghezza ed 1 Kg di peso. La maturità sessuale è raggiunta solitamente attorno ai 2-3 anni di età.

#### **Alimentazione:**

è un predatore di insetti, vermi. piccoli crostacei e giovani pesci.

#### **Habitat:**

diffuso soprattutto nei grossi corsi d'acqua di fondovalle con correnti rapide e fondali ghiaiosi o sassosi (zona a Temolo). E' molto sensibile agli inquinamenti e frequenta solo le acque correnti fresche, ossigenate e limpide; per tali motivi la sua presenza è in progressiva diminuzione.

#### **Comportamento:**

il Temolo conduce vita gregaria: risente negativamente della competizione con la Trota fario e la Trota iridea.

#### **Distribuzione:**

presente nella maggior parte dei paesi Europei, ad eccezione della Spagna e dell'Irlanda. In Italia era presente nel passato nei soli corsi d'acqua delle regioni settentrionali, ma in seguito è stato diffuso anche altrove.