

PSEUDORASBORA

Ciprinidi



PSEUDORASBORA (*Pseudorasbora parva* Temminck & Schlegel)
Famiglia: Cyprinidae

Morfologia:

la livrea presenta una zona verdastra sul dorso, argentea sui fianchi e bianca sul ventre. È presente una striscia longitudinale scura che decorre lungo i fianchi. Essa è completa solo negli individui più giovani e con l'aumento della taglia tende a scomparire.

Riproduzione e accrescimento:

durante il periodo riproduttivo i maschi presentano tubercoli nuziali intorno alla bocca e sotto l'occhio. La maturità sessuale viene raggiunta al primo anno di età e la deposizione può verificarsi più volte nell'arco di una stessa stagione riproduttiva. Il maschio sorveglia le uova fino alla schiusa che avviene generalmente dopo una settimana alla temperatura di 20 °C. Gli adulti misurano mediamente 8-9 cm, raggiungendo al massimo gli 11 cm di lunghezza.

Alimentazione:

Si nutre di crostacei planctonici, ma predilige organismi bentonici come larve di ditteri e chironomidi.

Habitat:

Predilige acque ferme o a lento corso con fondo argilloso-limoso.

Comportamento:

Il maschio difende strenuamente le uova fino alla schiusa.

Distribuzione:

originario dell'Asia orientale, sembra sia stato introdotto in Italia accidentalmente insieme ad altro pesce bianco.