

## SAVETTA

*Ciprinidi*



**SAVETTA (*Chondrostoma soetta* Bonaparte)**  
**Famiglia: Cyprinidae**

### **Morfologia:**

la Savetta ha corpo abbastanza slanciato e non molto compresso ai lati; molto simile alla Lasca, si riconosce da questa per le maggiori dimensioni e per la mancanza della banda scura sui fianchi. Il muso è prominente, il dorso scuro (grigio-blu e anche nero) con riflessi verdastri. La colorazione diventa più chiara ai lati con riflessi argentei; il ventre si presenta bianco-giallastro e le pinne sono in genere scure con sfumature giallo-rossastre.

### **Riproduzione e accrescimento:**

la riproduzione ha luogo da aprile a maggio ed avviene in genere di notte, in vicinanza delle rive; le uova, deposte su ghiaia o sabbia grossa, si schiudono dopo una settimana circa. La maturità sessuale viene raggiunta in genere al terzo anno di età in entrambi i sessi. L'accrescimento è lento: durante il primo anno di vita i giovani individui raggiungono una lunghezza di 5 cm, nel secondo anno misurano fino a 9-10 cm, nel terzo 15 cm e nel quarto 20 cm. A completa maturazione raggiunge i 30-40 cm di lunghezza ed i 50-700 gr di peso.

### **Alimentazione:**

è un tipico pesce di fondo e l'alimentazione è a base di organismi animali e vegetali.

### **Habitat:**

predilige i corsi d'acqua di grandi dimensioni ove l'acqua scorre limpida e veloce, ma è frequente anche in acque più lente e profonde.

### **Comportamento:**

durante il periodo riproduttivo (primavera) compie vere e proprie migrazioni, risalendo in branchi numerosi i corsi d'acqua minori, affluenti dei fiumi in cui vive.

### **Distribuzione:**

è specie indigena dell'Italia settentrionale.